

# QuEChERS AOAC 方法用于茄子中农药多残留的检测

本方法适用于含脂肪和色素较多的蔬菜水果中农药多残留的测定

## 一、样品提取

将茄子在 -18°C 下冷冻，彻底粉碎。准确称取粉碎好的茄子 15.0 g 于 50 mL 离心管中，加入 15 mL 1% 乙酸乙腈溶液，混匀，再加入 QuEChERS 萃取盐包（6 g 无水硫酸镁和 1.5 g 无水醋酸钠），涡旋 10 min，4000 r/min 离心 5 min。上层乙腈层待净化。

## 二、样品净化

首先在 15 mL QuEChERS 净化管（1.2 g MgSO<sub>4</sub>、400 mg PSA、400 mg GCB 和 400 mg C18）中加入 3 mL 甲苯，混匀取待净化的上层乙腈层 8 mL 于 15 mL QuEChERS 净化管中，涡旋 1 min，4000 r/min 离心 5 min。取上清液 1 mL，过 0.22 μm 滤膜，待上机测试。

## 三、仪器条件

GC-ECD 条件：

仪器：Agilent 7890A

色谱柱：Agilent J&W HP-5 (30 m×0.32 mm, 0.25 μm)  
或者相当者

进样口温度：220°C

检测器温度：300°C

升温程序：180°C (保持 2 min)

以 10°C /min 升温到 230°C (保持 2 min)

以 2°C /min 升温到 260°C (保持 2 min)

以 25°C /min 升温到 270°C (保持 1.6 min)

载气：氮气

流速：1.6 mL/min

进样方式：分流进样，分流比 10:1

LC-MS/MS 条件：

质谱仪：API 4000

色谱柱：Venusil ASB C18 (2.1 mm×150 mm, 5 μm)

流动相：A: 0.1% HCOOH+10 mM 乙 酸 铵 (取 1 mL HCOOH 和 0.77 g 乙酸铵至 1 L 水溶液中)

B: 甲醇

洗脱方式：梯度洗脱，见表 1

表 1 梯度洗脱条件

时间 /min	A(%)	B(%)
--	95.0	5.0
1.5	95.0	5.0
6.0	5.0	95.0
11.0	5.0	95.0
11.1	95.0	5.0
15.0	95.0	5.0

流速：0.35 mL/min

柱温：40°C

进样体积：5 μL

离子源：电喷雾 (ESI)

扫描模式：正离子模式

检测方式：多反应监测 (MRM)

表 2 质谱仪离子源参数

Source/Gas	
Collision Gas(CAD)	6
Curtain Gas(CUR)	12
Ion Source Gas 1(GS 1)	50
Ion Source Gas 2(GS 2)	50
Ion Spray Voltage(IS)	5500
Temperature(TEM)	550
Interface Heater(ihe)	On

表 3 氨基甲酸酯类农药各组分名称、保留时间及母离子和子离子检测离子对

物质名称	保留时间 (min)	检测离子对	DP	EP	CE	CXP
涕灭威	7.06	208.1/89.1	30	10	22	12
		208.1/116.0	30	10	10	12
克百威	7.13	222.3/123.1	48	10	16	12
		222.3/165.2	48	10	31	12
灭多威	6.51	163.2/88.1	36	10	15	12
		163.2/106.1	36	10	12	12
涕灭威砒	6.25	223.1/86.2	69	10	21	12
		223.1/148.1	69	10	13	12
涕灭威亚砒	6.10	207.1/132.2	60	10	13	12
		207.1/89.1	60	10	22	12
甲萘威	7.18	202.1/145.2	58	10	12	12
		202.1/127.1	58	10	40	12

## 四、实验结果

表 4 0.1 mg/kg 茄子中有机氯类、拟除虫菊酯类农药多残留的添加回收结果

名称	回收率 (%)			平均回收率 (%)	RSD (%)
	1	2	3		
五氯硝基苯	79.8	73.2	70.4	74.5	6.5
百菌清	80.3	77.3	75.4	77.7	3.2
乙烯菌核利	103.1	94.2	93.9	97.1	5.4
三唑酮	121.9	111.3	111.3	114.8	5.3
腐霉利	113.6	102.4	100.2	105.4	6.8
异菌脲	130.6	126.3	128.0	128.3	1.7
联苯菊酯	120.9	107.5	109.6	112.7	6.4
甲氰菊酯	103.9	94.4	96.2	98.2	5.1
高效氯氟菊酯	100.7	91.6	93.9	95.4	5.0
氟氯菊酯	96.1	87.5	85.6	89.7	6.2
氯氟菊酯	80.6	75.8	73.3	76.6	4.9
氟氯戊菊酯	102.4	104.7	112.4	106.5	4.9
氰戊菊酯	97.2	87.1	85.0	89.8	7.3

表 5 0.05 mg/kg 茄子中氨基甲酸酯类农药多残留的添加回收结果

名称	回收率 (%)			平均回收率 (%)	RSD (%)
	1	2	3		
涕灭威	87.2	84.4	93.8	88.5	5.5
克百威	77.6	73.6	72.4	74.5	3.6
灭多威	75.8	85.6	84.2	81.9	6.5
涕灭威砒	92.2	101.0	104.0	99.1	6.2
涕灭威亚砒	92.0	92.2	88.8	91.0	2.1
甲萘威	77.0	72.1	73.4	74.2	3.4




图 1 添加水平为 0.1 mg/kg 茄子中有机氯和拟除虫菊酯类农药多残留检测色谱图




图 2 添加水平为 0.05 mg/kg 茄子中氨基甲酸酯类农药多残留检测色谱图

订购信息

货号	描述	包装
COQ050020H	6 g 无水硫酸镁、1.5 g 醋酸钠, 50 mL 离心管	50 支 / 盒
COQ015040H	1200 mg 无水硫酸镁、400 mg PSA、400 mg C18、400 mg GCB, 15mL 离心管	50 支 / 盒
SF130-22-PTFE	PTFE/Φ13 mm/0.22 μm/ 有机系	100 个 / 盒
MF047-45-MCE	MCE/Φ47 mm/0.45 μm/ 水系	200 片 / 盒
MF047-45-PTFE	PTFE/Φ47 mm/0.45 μm/ 有机系	200 片 / 盒
V2-AL	2 mL 棕色短螺纹广口样品瓶, 带书写处	100 个 / 盒
SC2-5	2 mL 蓝色聚丙烯盖, 预开口, 9-425	100 个 / 盒
SDC-3000-D	biocomma® 多管涡旋混匀仪	1 台 / 箱